- 13 Bogousslavsky J, Regli F. Infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure gauche. I. Corrélations clinico-tomodensitométriques. *Rev Neurol* 1987;143:21-31.
- 14 Bogousslavsky J. Lettre à l'éditeur. *Rev Neurol* 1986;142:796.
- 15 Fisher CM, Cole M. Homolateral ataxia and crural paresis: A vascular syndrome. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1965;28:48-55.
- 16 Norrving B, Cronqvist S. Clinical and radiologic features of lacunar versus nonlacunar minor stroke. *Stroke* 1989;20:59-64.
- 17 Arboix A, Martí-Vilalta JL, Garcia JH. Clinical study of 227 patients with lacunar infarcts. *Stroke* 1990;21:842-7.
- 18 Hommel M, Besson G, Le Bas JF, et al. Prospective study of lacunar infarction using MRI. *Stroke* 1990;21:546-54.
- 19 Chamorro A, Sacco RL, Mohr JP, et al. Clinical-CT correlations of lacunar infarction in the stroke data bank. *Stroke* 1991;22:175-81.
- 20 Gerstmann J. Zur Kenntnis der Störungen des Körpergleichgewichtes nach Schubverletzung des Stirnhirns. *Monatschr Psychiat Neurol* 1916;40:354-77.
- 21 Claude H, Lhermitte J. Les paraplégies cérébellospasmiques et ataxo-cérébello-spasmodiques consécutives aux lésions bilatérales des lobules paracentraux par projectiles de guerre. *Bull Soc Méd Hôp Paris* 1916;40:796-804.
- 22 Nicolesco J, Cretu V, Demetresco L. Syndrome de l'artère cérébrale antérieure. Monoplégie crurale droite avec symptomatologie cérébelleuse prépondérante. *Bull Soc Méd Hôp Bucarest* 1920;10:247-50.
- 23 Foix C, Thévenard A. Symptômes pseudo-cérébelleux d'origine cérébrale, tubercule de la région paracentrale postérieure. *Rev Neurol* 1922;1:1502-4.
- 24 Alajouanine T, Lemaire A. Tumeur de la région paracentrale postérieure avec symptômes pseudo-cérébelleux. *Rev Neurol* 1925;1:71-5.
- 25 Mizon JP, Rosa A. Hémiparésie à prédominance crurale et ataxie ipsilatérale par méningiome de la faux du cerveau. *Rev Neurol* 1986;142:68-9.

Death of Wegener

The sad death of Friederich Wegener in 1990¹ may remind neurologists that the nervous system is affected in 48% of patients² suffering the illness which bears his name. Wegener studied medicine in Munich and Kiel. In 1933 his first post-mortem was of a patient with granulomatous vasculitis. He presented this case with two other cases from Chemnitz and Breslau to the German Society of Pathology at Breslau in 1936. Aschoff had noted the disease was different from periarteritis nodosa. He published his observations in his classic paper³ "On a peculiar rhinogenic granulomatosis with particular involvement of the arterial system and the kidney".

He settled in Lübeck working as a lecturer in Pathology and fulfilling many invitations to lecture on the arteritides. Lübeck bestowed on him the "Doctor Medicinæ Honoris Causæ" on his retirement. He was pleased with the advent of effective therapy with

cyclophosphamide and prednisolone; and with the serological aid to diagnosis afforded by the demonstration of granular fluorescent antinuclear cytoplasmic antibody in significant titre.

Early in 1990 he lectured to the International European meeting on Wegener's Granulomatosis and Related Vasculitic Syndromes in Zweibrücken. He died aged 83 on 9 July 1990.

JMS PEARCE

- 1 Wegener Friederich. Obituary (by Harald Lehmann). *Lancet* 1990;336:738.
- 2 Cohen Tervaert JW, Huitema MG, Hene RJ, et al. Prevention of relapses of Wegener's granulomatosis by treatment based on antineutrophil cytoplasmic antibody titre. *Lancet* 1990;336:709-11.
- 3 Wegener F. Über eine eigenartige rhinogene Granulomatose mit besonderer Beteiligung des Arteriensystems und der Nieren. *Beitr path Anat* 1939;102:36.